

BabyD®

ベビーディー200

200


0歳からの
ビタミンDサプリメント



初めてご利用になる場合は、必ず
使用方法や使用上の注意をよく
お読みください。また、この説明
書は大切に保管してください。

お召し上がり方

栄養補給のため、1日1滴を目安に、お召し上がりください。



ふたを開けると図のような中栓がついています。
ここから1滴ずつビタミンDを含んだ液体が出て
きます。

授乳期のお子さまには、次のような方法でお召し上がりいただくこともできます。

- ◆ふたを開け、ボトルを垂直に下に向けると、数秒後に中身のしずくが出てきます。清潔にしたお母さまの乳首や指先、もしくはおしゃぶりなどにしずくを1滴滴下し、お子さまのお口にふくませてください。30秒ほど時間をかけてお口にふくませてあげることをおすすめします。
- ◆ミルクや食べ物に混ぜて、召し上がっていただくこともできます。



乳首に



指先に



食べ物に混ぜて

※容器からお子さまの口へ直接滴下し
ないでください。

check!

詳しくは、
右記のQRコードから
ご覧になれます。



摂取する上での注意事項

高カルシウム血症の方は本品の摂取をさけてください。
1日の摂取目安量を守り、過剰摂取しないように気を付けてください。
本品の使用により体に異常をきたした場合には使用を中止し、医師又は
薬剤師に相談していただくか、弊社までお問い合わせください。

使用上の注意

BabyD・200は、ふたをあけて垂直に下に向けると、1滴ずつ、正しい量が滴下されるように工夫されていますが、最初の1滴目は、垂直に下に向けてから数秒後に滴下されます。

最初の1滴が出たあとは、すぐに、2滴目、3滴目が出てきます。1滴目が滴下する様子をよく見て観察し、1滴目が落ちたら、すぐにボトルを立ててください。

- ◆内容量が少なくなってくると、1滴目が出てくるまでの時間が少し長くなってきます。(1滴目が出るまでの時間:2秒~6秒くらい)また、中栓に内容物がたくさん付着していると、出にくいこともあります。その場合は、しばらく静置してから再度おためしてください。
- ◆商品の特性上、液残量が約1.2gぐらいになると出にくくなります。安定して約90滴分を使用いただくために、使用量以上の量をいれておきます。開封後は、3カ月を目安にお使いください。
- ◆本品は、横に寝かせず立てた状態で保管してください。
- ◆この説明書は捨てずに、箱と一緒に保管してください。
- ◆お子さまの手の届かないところに保管してください。

お問合せ先

商品についてのお問合せは下記までご連絡ください。

☎ 0120-181-109

平日9:00~21:00 (土・日・祝日9:00~17:00)

「BabyD」は森下仁丹(株)の登録商標です。